



السرنجات ذات الإستخدام الواحد - الحلول البسيطة للمعايير المصرية لسلامة المريض

المعيار 5 PS: يتم التخلص من السرنجات ذات الاستخدام الواحد بعد استخدامها مرة واحدة لمنع العدوى المتعلقة بالرعاية الصحية

أهمية المعيار: إعادة استخدام السرنجات ذات الإستخدام الواحد يؤدى إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم وأهمها الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا الكبدي بي HBV و سى HCV والإصابة بفيروس العوز المناعي HIV و منها أيضاً الأمراض البكتيرية مثل تسمم الدم والخراجات ومنها أيضاً الأمراض الطفيلية مثل الملاريا.

تحقيق المعيار: بالتخلص الآمن والفورى للسرنجة وباقى محتواها من الدواء و إبرة الحقن (السن) بعد إستخدامهما لمرة واحدة فقط و لا يعاد إستخدامهما مرة أخرى حتى نفس الشخص. السرنجة تعتبر ملوثة فور إستخدامها.

الحقن الآمن: الحقن الآمن هو الذى لا يتسبب فى أذى للمتلقى له و لا يعرض مقدم فريق الرعاية الصحية إلى أي مخاطر.

التخلص الآمن: التخلص الفورى من السرنجة و إبرة الحقن بأسلوب لا يؤدى إلى إعادة إستخدامهما أو وغز فريق الرعاية الصحية.

عبوات الاستخدام الواحد: تحتوى هذه العبوات و منها الأمبول و منها الفايل على مادة دوائية دون إضافة مادة حافظة تمنع تكاثر الفيروسات أو البكتيريا بها و لذلك يجب التخلص من السرنجة و إبرة الحقن فور إستخدامها لمرة واحدة حتى و ان لم تتعطى الجرعة الدوائية بأكملها. تعتبر أيضاً هذه العبوات ملوثة فور إستخدامها و لذلك يجب التخلص منها فور إستخدامها لمرة واحدة حتى و إن لم تستخدم كامل المادة الدوائية التي بها. ينطبق هذا أيضاً على عبوات المحاليل.

عبوات الاستخدام المتعدد: تحتوى هذه العبوات (فايل) على مادة دوائية مضان إليها مادة حافظة لمنع تكاثر البكتيريا فقط حيث إنها غير فعالة ضد الفيروسات. يجب أن ينص ملصق العبوة إنها مصنعة خصيصاً للإستعمال المتعدد و أن لا تتعدى مدة إسعمال العبوة بعد فتحها الفترة الزمنية المقرر لها. لا يفضل إستخدام هذه العبوات في وجود بديل مماثل داخل عبوات ذات الإستخدام الواحد و ذلك لإمكانية تلوث تلك العبوات خاصة بالفيروسات. تستخدم سرنجة و إبرة حقن جديدة في كل مرة يراد الحصول على كمية من الدواء من تلك العبوات.

معنى الإستخدام الواحد: الإستخدام الواحد يشمل المفاهيم الثلاثة التالية:

١. الدواء داخل عبوات الإستخدام الواحد يستخدم لمريض واحد فقط.
٢. المحاليل ذات الإستخدام الواحد تستخد لمريض واحد فقط و خلا علاج واحد فقط.
٣. السرنجات ذات الإستخدام الواحد و إبرة الحقن (السن) تستخدم لمريض واحد فقط و لإجراء واحد فقط.

الممارسات الخاطئة: الممارسات التالية مثبت أنها أدت إلى نشر مرض الإنفلونزا الكبدي الفيروسي بي HBV و سى HCV:
 ١. استخدام نفس السرنجة لإعطاء دواء لأكثر من مريض حتى مع تغيير إبرة الحقن (السن).
 ٢. استخدام عبوة الدواء لأكثر من مريض و إستخدام إبرة حقن (السن) مستعملة لسحب الدواء منها.
 ٣. استخدام عبوة محلول ملح مشتركة للحصول على كمية من محلول الملح ب باستخدام سرنجة مستعملة.
 ٤. استخدام نفس عبوة محلول وريدي (محلول ملح) لأكثر من مريض.

الإجراءات التالية مثبت أنها مرتبطة بإعادة إستخدام السرنجات و سنون الحقن ذات الإستخدام الواحد:

١. التخدير مع الجراحات أو التدخلات التشخيصية أو معالجة الألم.
٢. العلاج الكيميائى الوريدى و التطعيم و التدخلات التجميلية و العلاج البديلى.
٣. استخدام محلول الملح فى تسليك أجهزة المحاليل و الكانيولات.

الأدوية المرتبطة: الأدوية التالية مرتبطة بإعادة إستخدام السرنجات و سنون الحقن ذات الإستخدام الواحد:
 المسكنات بأنواعها - أدوية التخدير - مضادات التجلط - العلاج الكيميائى - أدوية القلب

مارسات حقن خاطئة مرتبطة بالكانينولا: إستعمال السرنجة فى إعطاء دواء من خلال الكانيولا دون عملية سحب لايضمن عدم دخول كمية صغيرة من الدم (الغير مرئية) داخل السرنجة و لذلك تعتبر السرنجة ملوثة فور إستخدامها و لا يعاد إستخدامها. ينطبق هذا المبدأ أيضاً على الحقن عن بعد من خلال الوصلات الوريدية لأن جميع المكونات من عبوة الدواء أو محلول الأنابيب (جهاز المحلول) و الصمامات و مواضع الحقن و الكانيولا أو الإبرة تعتبر وحدة واحدة.

مارسات خاطئة أخرى: إعادة إستخدام السرنجة ذات الإستخدام الواحد فى تسليك الدرانق أو أجهزة الشفط الجراحية (راديوفاك).
 إعادة إستخدام السرنجة ذات الإستخدام الواحد (التوسي) فى غسيل أو علاج أمراض المثانة البولية.
 ترك إبر الحقن بعبوات الإستخدام المتعدد (الفايل) أو عبوات المحاليل.
 الاحتفاظ ببواقي الأدوية داخل السرنجات لإعادة إستخدامهم لنفس المريض أو مريض آخر.
 اعتبار إبر الحقن الغير مستعملة صالحة للاستخدام فيما بعد.

تلوث السرنجة: ملامسة أي جزء من السرنجة يجعل هذا الجزء ملوث ولهذا ينبغي علينا عدم ملامسة الأجزاء التي تتصل بالدواء المعطى أو بالمريض كما هو موضح بالرسم (الأسمى). ملامسة أي من هذه الأجزاء يلزمنا بالتخلص الفورى من السرنجة و إبرة الحقن حتى و هي ممتنة بالدواء حيث أنها أصبحتنا غير معقظتين وغير صالحتين للاستخدام.



التحالف السكندرى لسلامة المرضى

خطوة العمل:

١. تحديد الأدوية وإجراءات المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات ذات الاستخدام الواحد:

- الإسنفار من هيئة التمريض والأطباء عن إعادة استخدام السرنجات أثناء رعاية مرضاهem.
- تحديد الأدوية المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات بالعنابر وذلك بمراجعة ملفات المرضى تحديد الأدوية التي تعطى مطلة أو بصورة مكررة.
- تحديد إجراءات التشخيصية والعلاجية المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات.
- إعداد قائمة بالأدوية والمحاليل والتخصصات والأماكن المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات.

٢. دراسة الأسباب المؤدية لإعادة استخدام السرنجات ذات الاستخدام الواحد:

- تقييم الوضع المعرفى لهيئة التمريض والأطباء عن سلامه الحقن.
- معرفة أسباب إعادة استخدام السرنجات وإبر الحقن من وجهة نظر هيئة التمريض والأطباء.
- توفير الأدوية بجرعات لا تجر الفريق الصحى على تخليها وبالتالي إعادة استخدام السرنجات.
- تحديد تكلفة الأدوية المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات لإثبات عدم الجدوى الاقتصادية من ذلك.

٣. وضع السياسات والإجراءات المنظمة لاستخدام السرنجات ذات الاستخدام الواحد:

- وضع السياسة (المبدأ) التي سوف يلتزم بها الجميع (انظر تحقيق المعيار).
- وضع الإجراءات (الخطوات العملية) التي تضمن تنفيذ السياسة واستخدام الأمبول والفials واجهزه المحاليل والسرنجات وإبر الحقن وعيوبات التخلص منها والممارسات المانعة للتلوث.
- تحديد الجهة والشخص المسؤول عن تنفيذ تلك السياسة والإجراءات والإعلان عنها.
- توفير مستلزمات الحقن الآمن (السرنجات، إبر الحقن، عيوبات الماء الصغيرة، الخ) والوصلات الوريدية للحقن المتعدد خاصة بالعمليات لضمان نجاح السياسة وإلتزام الجميع بتطبيق الإجراءات.

٤. تنفيذ أعضاء فريق الرعاية الصحية على تعديل ممارساتهم الخاصة:

- عقد جلسات تنفيذية وتدريبية لهيئة التمريض والأطباء عن سياسة وإجراءات سلامه الحقن المقترنة.
- التنبيه على الأطباء أن الجرعات المطلة يمكن أن تكون غير فعالة.
- إعداد منشورات تنبيهية توضح خطورة إعادة استخدام السرنجات وإبر الحقن.
- عقد جلسات تنفيذية مع المرضى لتخفيذه على المشاركة في برنامج "سعنا صوتك".
- تدريب فريق الرعاية الصحية على قبول مشاركة المرضى في ضمان سلامتهم.

للتعرف على مدى تحقيق هذا المعيار تجمع البيانات التالية قبل وبعد تنفيذ خطة العمل وبصفة دورية:

البيانات الدالة على تطبيق المعيار:*

١. المستوى المعرفى لهيئة التمريض والأطباء عن مفهوم الإستخدام الواحد لسلامة السرنجات وإبر الحقن والأدوية والإجراءات المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات وإبر الحقن.
٢. عدد السجلات الطبية المدون بها أدوية مخففة وتعطى عند اللزوم.
٣. وجود عيوبات الإستخدام المتعدد (الفials) غير مخصصة لمريض واحد.
٤. وجود عيوبات الإستخدام الواحد (الأمبول) مفتوحة وبها دواء بغرض إعادة استخدامها.
٥. وجود سرنجات مفتوحة فارغة أو بها دواء معد لإعادة استخدامها.
٦. وجود إبر حقن متزوجة بعيوبات الأدوية (الفials) أو المحاليل بغرض إعادة استخدام محتواها.
٧. مدى إلمام المرضى بمشكلة إعادة استخدام السرنجات.

يجب تكوين فريق مسئول لضمان نجاح خطة العمل مع تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها. عضوية الفريق يجب أن تukan الأفراد المعنيين بالإجراءات والممارسات المرتبطة بإعادة استخدام السرنجات وسنون الحقن ذات الإستخدام الواحد وأن تعكس إهتمام الإدارة بحل تلك المشكلة.

فريق التنفيذ:

مشاركة المريض:

معرفة المريض بمضمون المعيار يضمن إلى حد كبير إلتزام فريق الرعاية الصحية بعدم استخدام السرنجات ذات الإستخدام الواحد. يجب توعية فريق الرعاية الصحية على الترحيب بمشاركة المريض في ضمان سلامته. يمكن تحميل برنامج "سعنا صوتك" من الموقع الإلكتروني للتحالف السكندرى لسلامة المرضى www.mri.edu.eg

آلية التطبيق:*

أعدت آلية التطبيق للمساعدة فى تطبيق معايير السلامة وذلك من خلال وضع خطة عمل زمنية لتحقيق المعيار بناء على البيانات المجمعة عن مدى تطبيق المعيار على أن تكرر خطة العمل بعد تعديلها بناء على البيانات المجمعة الجديدة حتى يتحقق تطبيق المعيار بالصورة المرجوة.

*** المواد المساعدة:**

يمكن تحميل الشرائح التعليمية ونشرات التنبيه وإسهامات جمع البيانات (Audit Sheets) وتقدير المستوى المعرفى وآلية التطبيق من الموقع الإلكتروني للتحالف السكندرى لسلامة المرضى: www.mri.edu.eg

منتدى النقاش الإلكتروني لسلامة الحقن بالتحالف السكندرى لسلامة المرضى.

إعداد: