



إعادة استخدام السرنجات - العنبر

- المستوى المطلوب: ١. عدم وجود أوامر علاجية تجبر هيئة التمريض على إعادة استخدام السرنجات و إبر الحقن.
٢. إتزام هيئة التمريض بعدم إعادة استخدام السرنجات و إبر الحقن.

إسم الوحدة:	التاريخ:	عدد المرضى بالوحدة:	عدد السجلات المراجعة:
-------------	----------	---------------------	-----------------------

مؤشرات إعادة استخدام السرنجات و إبر الحقن من واقع السجل الطبى

م	المعيار	العدد	ملاحظات
١	عدد السجلات المدون بها دواء محلل و يعطى عند اللزوم (المسكنات)		
٢	عدد السجلات المدون بها دواء محلل و يعطى بجرعات ثابتة (مضاد حيوى)		
٣	عدد السجلات المدون بها دواء متعدد الجرعات (الإنسولين)		
٤	عدد السجلات المدون بها تسليك جهاز الشفط (راديفاك) أو غسيل المثانة		

ملاحظة أماكن تحضير الدواء و التلججات و الأماكن المحيطة بالمرضى

م	المعيار	العدد	ملاحظات
٥	عدد السرنجات المفتوحة الفارغة أو المعبأة و المعدة لإعادة استخدامها		
٦	عدد عبوات الأدوية أحادية الجرعة مفتوحة و بها بواقى دواء معد لإعادة استخدامه		
٧	عدد عبوات الأدوية متعددة الجرعات و ليست مخصصة لمريض واحد		
٨	عدد عبوات الأدوية متعددة الجرعات و بها إبرة حقن		
٩	عدد المحاليل المتصلة بالمريض و بها إبرة حقن أو بها ثقب		
١٠	عدد المحاليل بجوار المريض و غير متصلة و لكن بها محلول معد لإعادة استخدامه		

أسئلة لهيئة التمريض (ثلاثة)

م	المعيار	الأول	الثانى	الثالث
١١	هل لديكم عدد كاف من السرنجات لإستخدامها مرة واحدة فى إعطاء الدواء؟			
١٢	هل لديكم أمبولات ماء لتحليل الأدوية؟			
١٣	هل تستخدم زجاجة محلول ملح مشتركة لتحليل الأدوية؟			
١٤	هل يتم الإحتفاظ بالسرنجة بعد عملية تسليك الكانيولات / القساطر / المثانة؟			
١٥	هل يتم الإحتفاظ بسرنجة الإنسولين بعد إستعمالها؟			

أسئلة للمرضى (ثلاثة)

م	المعيار	الأول	الثانى	الثالث
١٦	هل تستخدم السرنجة الواحدة أكثر من مرة فى تنفيذ علاجك؟			
١٧	هل تريد منع إعادة استخدام السرنجات عن طريق طلب ذلك من الفريق الصحى؟			

إعادة استخدام السرنجات - التدخلات

المستوى المطلوب: ١. إنزام الأطباء و هيئة التمريض بعدم إعادة استخدام السرنجات و إير الحقن أثناء التدخلات التشخيصية و العلاجية.

إسم الوحدة:	التاريخ:
-------------	----------

مراجعة مكان حفظ الدواء أو التلاجة بالوحدة

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
١	سرنجات مستعملة معبأة بالدواء			
٢	فيال به إبرة حقن			

ملاحظة السرنجات قبل بدء الإجراء

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
٣	سرنجات معبأة سابقاً بأدوية باقية من إجراء سابق			

تعبئة الدواء أثناء الإجراء

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
٤	تستخدم سرنجات مستعملة في تعبئة الدواء من الأمبول			
٥	تستخدم سرنجات مستعملة في تعبئة الدواء من الفيال			

إعطاء الدواء أثناء الإجراء

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
٦	تستخدم وصلات (صمامات) وريدية تسمح بالحقن المتعدد			

التخلص من السرنجات

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
٧	توضع السرنجة في حوض كلوى أو على سطح لإعادة إستخدامها			
٨	يتم التخلص من السرنجة فور إستخدامها (تفريغها من الدواء)			
٩	يتم الحفاظ على السرنجة لإعادة إستخدامها في إجراء آخر			

ممارسات خاطئة

م	المعيار	تعم	لا	ملاحظات
١٠	وجود عبوات ماء مقطر لتحليل أو تخفيف الأدوية			
١١	إستخدام عبوات الماء المقطر لتحليل أو تخفيف الأدوية			